

INSTRUÇÕES DE MANEJO DE MEDICAMENTOS PARA PROCEDIMENTOS ENDOSCÓPICOS

ANTICOAGULANTES

- Recomendamos a interrupção dos anticoagulantes antes de determinados procedimentos para reduzir o risco de sangramento, mas **você deve verificar com o seu clínico geral ou cardiologista se é seguro interromper temporariamente esses medicamentos.**

Recomendações (se for atendido em uma clínica de anticoagulação, entre em contato com seu médico para obter ajuda):

Coumadin (varfarina)	Interromper 5 dias antes do procedimento
Xarelto, Eliquis, Savaysa, Pradaxa	Interromper 2 dias antes do procedimento
Lovenox (enoxaparina), Fragmin (dalteparina)	Interromper 1 dia antes do procedimento
Aspirina	NÃO interromper
Plavix (clopidogrel), Effient (prasugrel), Ticlid (ticlodipina), Brilinta (ticagrelor)	Interromper 5 a 7 dias antes do procedimento. Para Ticlid, interromper 1 a 2 semanas antes – Você deve consultar seu cardiologista ou clínico geral primeiro!

MEDICAMENTOS PARA DIABETES

- Pode ser necessário ajustar a medicação para diabetes para evitar níveis perigosamente BAIXOS de açúcar no sangue durante o jejum no dia do procedimento.
- Fale com seu clínico geral ou endocrinologista (médico de diabetes) se precisar de ajuda para ajustar seus medicamentos antes do procedimento.

Recomendações:

Insulina de ação prolongada ou pré-misturada	Tome ½ de sua dose habitual no dia anterior ao procedimento
Comprimidos orais para diabetes (por exemplo, glipizida, metformina)	Não tome na manhã do procedimento
Terapia com bomba de insulina	Consulte seu endocrinologista
Inibidores de SGLT2 (terminam com “-flozina”): Invokana, Farxiga, Jardiance	Interromper 3 a 4 dias antes do procedimento. Consulte seu endocrinologista
Antagonistas do receptor GLP-1 (terminam com “-tida”): Rybelsus, Trulicity, Ozempic, Victoza, Mounjaro, Wegovy	Se você toma esse medicamento diariamente, não o tome no dia do procedimento . Se você toma uma vez por semana, interrompa o uso uma semana antes do procedimento

MEDICAMENTOS PARA PERDA DE PESO

- Os medicamentos GLP1 para perda de peso podem desacelerar seu estômago, o que pode aumentar o risco de aspiração do conteúdo estomacal durante o procedimento.

Recomendações: Consulte a tabela acima se você estiver tomando um antagonista do receptor GLP-1 (o nome termina com “-tida”) - **não tome esse medicamento uma semana antes do procedimento**

MEDICAMENTOS PARA PRESSÃO ARTERIAL

- É importante que sua pressão arterial esteja sob bom controle no dia do procedimento.
- Se a sua pressão arterial estiver muito alta no dia do procedimento, ele poderá ser cancelado e reagendado por motivos de segurança.
- **Tome todos os seus medicamentos habituais para o sangue, inclusive no dia anterior e no dia do procedimento.**

COMPRIMIDOS DE FERRO

- Se você tiver uma COLONOSCOPIA agendada: Pare de tomar comprimidos de ferro **uma semana** antes do procedimento