

## INSTRUCCIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE MEDICAMENTOS EN PROCEDIMIENTOS ENDOSCÓPICOS

### ANTICOAGULANTES

- Recomendamos dejar de tomar anticoagulantes antes de ciertos procedimientos para reducir el riesgo de sangrado, pero **debe consultar con su médico de atención primaria (PCP, por sus siglas en inglés) o cardiólogo si es seguro que deje temporalmente estos medicamentos.**

**Recomendaciones** (si acude a una clínica de anticoagulación, póngase en contacto con su proveedor para obtener ayuda):

Coumadin (warfarina)	Suspenda el medicamento 5 días antes del procedimiento
Xarelto, Eliquis, Savaysa, Pradaxa	Suspenda el medicamento 2 días antes del procedimiento
Lovenox (enoxaparina), Fragmin (dalteparina)	Suspenda el medicamento 1 día antes del procedimiento
Aspirina	NO lo suspenda
Plavix (clopidogrel), Effient (prasugrel), Ticlid (ticlodipina), Brilinta (ticagrelor)	Suspenda el medicamento entre 5 y 7 días antes del procedimiento; para Ticlid, suspenda el medicamento entre 1 y 2 semanas antes. <b><i>¡Debe consultar primero con su cardiólogo o médico de cabecera!</i></b>

### MEDICAMENTOS PARA LA DIABETES

- Puede ser necesario ajustar su medicación para la diabetes para evitar niveles peligrosamente BAJOS de azúcar en sangre mientras ayuna el día de su procedimiento.
- Hable con su médico de atención primaria o endocrinólogo (médico especialista en diabetes) si necesita ayuda para ajustar sus medicamentos antes de su procedimiento.

**Recomendaciones:**

Insulina de acción prolongada o premezclada	Tome la mitad de su dosis habitual el día antes del procedimiento.
Píldoras orales para la diabetes (p. ej., glipizida, metformina)	No tome la mañana del procedimiento
Terapia con bomba de insulina	Consulte a su endocrinólogo
Inhibidores de SGLT2 (terminan en “-flozin”): Invokana, Farxiga, Jardiance	Suspenda el medicamento entre 3 y 4 días antes del procedimiento; Consulte a su endocrinólogo
Antagonistas del receptor GLP-1 (terminan en “-tide”): Rybelsus, Trulicity, Ozempic, Victoza, Mounjaro, Wegovy	Si lo toma a diario, no lo tome el <b>día del procedimiento</b> . Si lo toma una vez a la semana, <b>deje de hacerlo 1 semana antes</b> del procedimiento.

### MEDICAMENTOS PARA PERDER PESO

- Los medicamentos para adelgazar GLP1 pueden ralentizar su estómago, lo que puede aumentar el riesgo de aspirar contenido estomacal durante el procedimiento. **Recomendaciones:** Consulte la tabla anterior si toma un antagonista del receptor GLP-1 (el nombre termina en “-tide”). **No tome este medicamento durante 1 semana antes de su procedimiento**

### MEDICAMENTOS PARA LA PRESIÓN SANGUÍNEA

- Es importante que su presión sanguínea esté bien controlada el día de su intervención.
- Si su presión sanguínea es demasiado alta el día del procedimiento, es posible que se cancele y se re programe por razones de seguridad.
- Tome todos sus medicamentos habituales para la sangre, incluso el día antes y el día del procedimiento.**

### PÍLDORAS DE HIERRO

- Si tiene programada una COLONOSCOPIA: Deje de tomar las píldoras de hierro **1 semana** antes de la cita