

HƯỚNG DẪN QUẢN LÝ THUỐC CHO CÁC THỦ THUẬT NỘI SOI

THUỐC LOÃNG MÁU

- Chúng tôi khuyến cáo ngừng sử dụng thuốc loãng máu trước một số thủ thuật để giảm nguy cơ chảy máu, nhưng **quý vị cần tham khảo ý kiến PCP hoặc bác sĩ tim mạch để xác định liệu việc ngừng thuốc tạm thời có an toàn không.**

Khuyến nghị (Nếu quý vị được theo dõi tại Phòng khám Chống đông máu, vui lòng liên hệ với nhà cung cấp dịch vụ để được trợ giúp):

Coumadin (warfarin)	Ngừng 5 ngày trước thủ thuật
Xarelto, Eliquis, Savaysa, Pradaxa	Ngừng 2 ngày trước thủ thuật
Lovenox (enoxaparin), Fragmin (dalteparin)	Ngừng 1 ngày trước thủ thuật
Aspirin	KHÔNG ngừng sử dụng
Plavix (clopidogrel), Effient (prasugrel), Ticlid (ticlopidine), Brilinta (ticagrelor)	Ngừng 5-7 ngày trước thủ thuật; đối với Ticlid, ngừng 1-2 tuần trước – Quý vị phải tham khảo ý kiến bác sĩ tim mạch hoặc bác sĩ chăm sóc chính trước!

THUỐC ĐIỀU TRỊ TIỂU ĐƯỜNG

- Có thể cần điều chỉnh thuốc điều trị tiểu đường của quý vị để tránh mức đường huyết quá THẤP trong khi nhịn ăn vào ngày thực hiện thủ thuật.
- Trao đổi với PCP hoặc Bác sĩ nội tiết (bác sĩ tiểu đường) nếu quý vị cần hỗ trợ điều chỉnh thuốc trước thủ thuật.

Khuyến nghị:

Insulin tác dụng dài hoặc insulin trộn sẵn	Uống ½ liều thông thường vào ngày trước thủ thuật
Thuốc tiểu đường dạng viên (ví dụ: Glipizide, metformin)	Không uống vào buổi sáng ngày thực hiện thủ thuật
Máy bơm insulin	Tham khảo ý kiến Bác sĩ nội tiết
Thuốc ức chế SGLT2 (kết thúc bằng “-flozin”): Invokana, Farxiga, Jardiance	Ngừng 3-4 ngày trước thủ thuật. Tham khảo ý kiến Bác sĩ nội tiết
Thuốc đối kháng thụ thể GLP-1 (kết thúc bằng “-tide”): Rybelsus, Trulicity, Ozempic, Victoza, Mounjaro, Wegovy	Nếu uống hàng ngày, không uống vào ngày thực hiện thủ thuật. Nếu uống mỗi tuần một lần, ngừng uống thuốc 1 tuần trước thực hiện thủ thuật

THUỐC GIẢM CÂN

- Thuốc giảm cân GLP1 có thể làm chậm quá trình tiêu hóa, điều này có thể làm tăng nguy cơ hít phải thức ăn trong dạ dày trong quá trình thực hiện thủ thuật. **Khuyến nghị:** Tham khảo bảng trên nếu quý vị sử dụng thuốc đối kháng thụ thể GLP-1 (tên kết thúc bằng “-tide”) - **không uống thuốc này trong 1 tuần trước ngày thực hiện thủ thuật**

THUỐC HẠ HUYẾT ÁP

- Quan trọng là huyết áp của quý vị phải được kiểm soát tốt vào ngày thực hiện thủ thuật.
- Nếu huyết áp của quý vị quá cao vào ngày thực hiện thủ thuật, thủ thuật có thể bị hủy và lên lịch lại vì lý do an toàn.
- Uống tất cả các thuốc hạ huyết áp thông thường của quý vị, bao gồm cả ngày trước và ngày thực hiện thủ thuật.**

VIÊN SẮT

- Nếu quý vị được xếp lịch thực hiện NỘI SOI ĐẠI TRÀNG: Ngừng uống viên sắt **1 tuần** trước buổi hẹn