



DÉCLENCHEMENT DU TRAVAIL

Que signifie le fait que le travail soit déclenché ?

Le fait que le travail est déclenché signifie que le travail débutera à l'hôpital grâce à des médicaments et soins.

Combien de temps cela prendra-t-il s'il faut déclencher le travail ?

Déclencher le travail prend du temps ! La plupart des bébés ne naissent pas le jour de l'admission à l'hôpital. De 1 à 3 jours peuvent être nécessaires avant la naissance du bébé.

Comment le travail sera-t-il déclenché ?

Voici les médicaments et soins qui aident à la préparation du col utérin (la dilatation de l'utérus), et d'autres médicaments induisant le début des contractions.

Vous vous soumettrez à un examen à votre arrivée à l'hôpital pour mesurer l'ouverture de votre col utérin (dilatation). Vous et l'équipe déciderez du meilleur moyen de déclencher le travail à l'issue de cet examen.

À quoi dois-je m'attendre dès lors que le travail est déclenché ?

- Il faudra attendre pour manger.
- Vous pourrez boire de l'eau, du jus, du bouillon ou des sorbets.
- De temps à autre vous pourrez marcher, vous doucher, changer de position, dormir et aller aux toilettes par vous-même.
- Vous pourriez être équipée d'une ceinture de capteur sur votre ventre pour écouter les battements de cœur du bébé en permanence ou par intermittence.

Qu'utilise-t-on pour le déclenchement du travail ?

Le décollement des membranes peut contribuer à la préparation du col utérin au travail. Il s'agit d'une intervention réalisée par toucher vaginal dans le col de l'utérus s'il est ouvert (dilaté) pour aider à la séparation des membranes (sac d'eau) du col de l'utérus.

Misoprostol est un comprimé qui aide à la préparation du col de l'utérus pour le travail. Ce comprimé peut être avalé ou placé à l'intérieur du vagin. Parfois le misoprostol peut provoquer des contractions.

Le ballonnet de Cook est un tube avec un ballon placé à l'intérieur du col de l'utérus pour aider à l'ouvrir lentement (dilatation). Il est posé pour un maximum de 12 heures pour aider à préparer le col de l'utérus au travail.

L'Ocytocine (pitocin) est un médicament qui peut être administré par perfusion qui démarre le travail et déclenche les contractions

L'amniotomie consiste à rompre la poche des eaux et est parfois pratiquée pour déclencher ou faire progresser le travail. Nous utilisons un instrument semblable à un crochet pour rompre la poche des eaux.

